

Jabalíes y Peste Porcina Africana




Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
CSIC, UCLM, JCCM



¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica hemorrágica muy letal en cerdos y jabalíes. Este virus no se transmite a personas. La PPA puede causar mortalidades superiores al 90% en poblaciones naturales de jabalí, y provoca el sacrificio obligatorio de todos los cerdos de las granjas infectadas. Se transmite por contacto estrecho en los grupos sociales, así como por sangre, por ejemplo, mediante el contacto de jabalíes sanos con cadáveres o restos de jabalíes infectados. El virus puede sobrevivir varios meses en cadáveres o en restos de jabalí.



Lesiones compatibles con PPA en jabalíes: Bazo muy aumentado de tamaño (esplenomegalia, izquierda); bazo con infarto (centro) y riñón con hemorragias puntiformes (petequias, derecha).

España y la peste porcina africana

España es oficialmente libre de PPA desde 1995, lo que facilita la exportación de productos de porcino a todo el mundo. Actualmente, la PPA se expande por el norte y el este de Europa. Los casos más cercanos ocurren en Bélgica. Aunque se toman todo tipo de medidas preventivas, el virus podría llegar por medio de alimentos contaminados o por medio de cerdos o jabalíes importados irregularmente desde zonas infectadas.

El impacto sobre el sector porcino y sobre la caza sería dramático. El porcino genera en España más de 300.000 puestos de trabajo y un balance positivo gracias a las exportaciones. Para la caza, la PPA significaría la desaparición temporal de las poblaciones de jabalí y una barrera para el uso de perros en las cacerías.




(Cortesía José Ardaiz)



El jabalí: una especie plaga

En las últimas décadas, las poblaciones de jabalí se han multiplicado dando lugar a daños a la agricultura, a accidentes de tráfico y otros riesgos para la salud pública, a problemas derivados de la presencia de jabalíes urbanos, y a daños al medio ambiente. Pero, sobre todo, la sobreabundancia de jabalíes causa crecientes conflictos con la ganadería y la sanidad animal.

Además del riesgo que supone la PPA, el jabalí mantiene el ciclo de zoonosis graves, como la triquinosis, y de enfermedades de enorme impacto en sanidad animal, como la tuberculosis.



¿Cómo actuar ante un jabalí enfermo o muerto?

Cuando se descubre un jabalí muerto, especialmente si hay varios cadáveres, se trata de un cadáver fresco, o el hallazgo se produce lejos de una carretera, conviene actuar de la siguiente manera:

1. Evite manipular el cadáver.
2. Tome varias fotografías del cadáver y de su entorno inmediato.
3. Localice el lugar del hallazgo mediante la utilidad GPS de su teléfono móvil (por ejemplo, enviando la ubicación mediante WhatsApp).
4. Identifique el sitio marcando la vegetación con algún material llamativo, por ejemplo, con una cinta de color blanco o vivo.
5. Alerta al agente forestal o de medio ambiente, o a los servicios veterinarios, informando sobre el hallazgo y la localización más exacta posible. También puede llamar al teléfono 112.



La caza y la peste porcina africana

La primera señal de que la PPA ha saltado a jabalíes es la aparición masiva de ejemplares muertos, a veces en grupos familiares. Pueden observarse además animales débiles, moribundos, sin instintito de huida.



Cortesía *Marius Masulis*, Letonia.




En la zona infectada se restringe toda actividad, especialmente la caza con perros, en un intento de limitar la difusión de la infección. Se instalan vallados periféricos y se refuerzan las barreras existentes. En la zona periférica, en cambio, se procura reducir las densidades al mínimo posible. Esta situación dificulta la caza tradicional y puede alargarse más de un año.

Los cazadores ayudan en la lucha contra la PPA y otras enfermedades:

1. Contribuyendo, mediante la caza, a regular las poblaciones de jabalí.
2. Evitando que los restos de jabalí queden al alcance de otros jabalíes.
3. Alertando a los agentes forestales o a los servicios veterinarios de la aparición de jabalíes muertos o moribundos.
4. En su momento, colaborando en la búsqueda de cadáveres y en la reducción preventiva de las poblaciones de jabalí de la zona periférica.
5. Evitando traer del extranjero trofeos o carne de jabalí sin tratamiento previo, y limpiando concienzudamente ropas y utillaje.

La caza supone el aprovechamiento de un recurso natural renovable, como las setas. Pero a diferencia de éstas, no cazar (no cosechar la producción anual) da lugar a un crecimiento no deseado de determinadas poblaciones animales. La presión cinegética actual no basta para estabilizar las poblaciones de jabalí, pero contribuye mucho a su regulación.



Más información: Guía enfermedades fauna silvestre

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF; Vídeo sobre actuaciones

ante un brote de PPA <http://www.irec.es/video/video-actuacion-ante-emergencias-sanitarias-jabali/>